



薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…28	Day1 (/)
オプジーボ 480mg/body	点滴	mg	↓	4週1コース	↓



薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15分/点滴
②オプジーボ	240mg			mg	生食 100mL	30分/点滴
③生食	50ml	1V				5分/点滴



【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

食道癌の術後補助化学療法の場合は、最大12か月まで使用可能

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	2~14	…Day21	Day1 (/)
エルプラット (I-OHP) 100mg/m ²	点滴	mg	↓		3週1コース	↓
エスワンタイホウ ※下記参照	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		3週1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑			↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑

↑ 患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

	薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①	エルプラット	100mg			mg	ブドウ糖 5%500mL	120分/点滴
	デカドロン	6.6mg	0.5A	3.3mg	3.3mg		
②	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	0.5A	3.3mg	3.3mg		
③	生食	50ml	1V				15分/点滴

投与間隔>

(30分)

(120分)

(15分)

投与順番>

②

→

①

→

③

→

終了

【コメント】

※ エスワンタイホウ (S-1) は処方入力。

S-1 : 1日2回朝・夕食後、14日投薬7日休薬

S-1 投与量 BSA < 1.25 m² : 80mg/day

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100mg/day

1.5 m² ≤ BSA : 120mg/day

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	2~14	…Day21	Day1 (/)
エルプラット (I-OHP) 130mg/m ²	点滴	mg	↓		3週1コース	↓
ゼローダ 2000mg/m ²	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		3週1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑			↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑

↑ 患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

	薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①	エルプラット	100mg			mg	ブドウ糖 5%500mL	120分/点滴
	デカドロン	6.6mg	0.5A	3.3mg	3.3mg		
②	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	0.5A	3.3mg	3.3mg		
③	生食	50ml	1V				15分/点滴

投与間隔>

(30分)

(120分)

(15分)

投与順番>

②

→

①

→

③

→

終了

【コメント】

※ゼローダ (カペシタビン) は処方入力。

ゼローダ用法 (C法) : 1日2回朝・夕食後、14日投薬7日休薬

ゼローダ投与量 (C法) BSA < 1.36 m² : 2400mg/day

1.36 m² ≤ BSA < 1.66 m² : 3000mg/day

1.66 m² ≤ BSA < 1.96 m² : 3600mg/day

1.96 m² ≤ BSA : 4200mg/day

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 8 (/)	Day 15 (/)	…Day28	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 80mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	4週1コース	↓
サイラムザ 8mg/kg	点滴	mg	↓		↓		↓

支持療法

薬品名 投与量	投与方法	初回 9.9mg	2回目以降 6.6mg	Day1	Day 8	Day 15	…Day28	Day1
デカドロン 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴	↑	↑	↑	↑	↑	4週1コース	↑
ガスター 20mg/body	点滴	↑	↑	↑	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	↑	↑	↑	↑	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	↑	↑	↑	↑	↑		↑

《薬剤調製》

↑
患者投与量との一致を確認!
↓

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①サイラムザ	100mg	100mg	100mg	mg	生食 250mL	60分/点滴
	500mg	500mg	500mg			
②パクリタキセル	30mg	30mg	30mg	mg	生食 250mL	60分/点滴
	100mg	100mg	100mg			
③	デカドロン 初回 9.9mg	1.5 A	9.9 mg	9.9 mg	生食 100mL	15分/点滴
	2回目以降 6.6mg	1A	6.6 mg	6.6 mg		
	ガスター	20mg	1A	20 mg		
	ネオレスタール	10mg	1A	10 mg	10 mg	
④	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg		30分/点滴
⑤	生食	50mL	1V			5分/点滴
⑥	生食	50mL	1V			5分/点滴

投与間隔>

(15分)

(30分)

(60分)

(5分)

(60分)

(5分)

投与順番>

③

→ ④

→ ①

→ ⑤

→ ②

→ ⑥

→ 終了

【コメント】

パクリタキセル/サイラムザはインラインフィルター付きルート使用

◇レジメン No.06013 《胃癌：サイラムザ療法》 外科

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
サイラムザ 8mg/kg	点滴	mg	↓	2週を1コースとする	↓

(支持療法)

ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑	2週を1コースとする	↑
----------------------	----	------	---	------------	---

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
① サイラムザ	100mg	 	 	mg	生食 250mL	60分/点滴
	500mg	 	 			
② ネオレスタール	10mg	1A	10mg	10mg	生食 100mL	15分/点滴
③ 生食	100mL	1V	 	 	 	30分/点滴
④ 生食	50mL	1V	 	 	 	5分/点滴

投与間隔» (15分) (30分) (60分) (5分)
 投与順番» ② → ③ → ① → ④ → 終了

【コメント】

インラインフィルター付きルート使用

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)		Day15 (/)	…28	Day1 (/)
アブラキサン (nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓	4週1コース	↓
サイラムザ 8mg/kg	点滴	mg	↓				↓		↓

支持療法

デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑		↑	4週1コース	↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑				↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑		↑		↑

《薬剤調製》

患者投与量との一致を確認！

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①サイラムザ	100mg	 	 	mg	生食 250mL	60分/点滴
	500mg	 	 			
②アブラキサン	100mg	 	 	mg	生食 100mL	30分/点滴
③	デカドロン 6.6mg	1 V	6.6 mg	6.6 mg	生食 100mL	15分/点滴
	ネオレスタール 10mg	1 A	10 mg	10 mg		
④	デカドロン 6.6mg	1 V	6.6 mg	6.6 mg	 	15分/点滴
	グラニセトロン点滴バッグ 1mg	1 V	1 mg	1 mg		
⑤	グラニセトロン点滴バッグ 1mg	1 V	1 mg	1 mg	 	30分/点滴
⑥	生食 50mL	1 V	 	 	 	5分/点滴
⑦	生食 50mL	1 V	 	 	 	5分/点滴

Day1・15

投与間隔≫

(15分) (30分) (60分) (5分) (30分) (5分)

投与順番≫ ③ → ⑤ → ① → ⑥ → ② → ⑦ → 終了

Day8

投与間隔≫

(15分) (5分) (30分) (5分)

投与順番≫ ④ → ⑥ → ② → ⑦ → 終了

【コメント】

サイラムザはインラインフィルター付きルート使用

アブラキサンはインラインフィルター付きルート使用不可

調製：アブラキサン 1Vあたり、生食 20ml で溶解したあと、生食のボトルを空にすること

(溶解し、採取したアブラキサンは生食で薄めないこと)

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	2~14	…Day21	Day1 (/)
ハーセプチン (HER) 初回 8mg/kg 以降 6mg/kg	点滴	mg	↓		3週1コース	↓
エルプラット (I-OHP) 100mg/m ²	点滴	mg	↓			↓
エスワンタイホウ ※1 下記参照	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		3週1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑			↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

	薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①	ハーセプチン	150mg			mg	生食 250mL	※2 下記参照/点滴
②	エルプラット	100mg			mg	ブドウ糖 5%500mL	120分/点滴
	デカドロン	6.6mg	0.5A	3.3mg	3.3mg		
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	0.5A	3.3mg	3.3mg		
④	生食	50mL	1V				5分/点滴
⑤	生食	50mL	1V				15分/点滴

投与間隔》

(※2 下記参照)

(5分)

(30分)

(120分)

(15分)

投与順番》 ① → ④ → ③ → ② → ⑤ → 終了

【コメント】

※1 エスワンタイホウ (S-1) は処方入力。

S-1 : 1日2回朝・夕食後、14日投薬7日休薬

S-1 投与量 BSA < 1.25 m² : 80mg/day1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100mg/day1.5 m² ≤ BSA : 120mg/day

※2 ハーセプチン投与速度 : 初回 90分、2回目以降 30分まで短縮可能

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	2~14	…Day21	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓		3週1コース	↓
エルプラット (I-OHP) 130mg/m ²	点滴	mg	↓			↓
エスワンタイホウ ※1 下記参照	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		3週1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑			↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
① オプジーボ	240mg	/	/	mg	生食 100mL	30分/点滴
	120mg					
② エルプラット	100mg	/	/	mg	ブドウ糖 5%500mL	120分/点滴
	デカドロン 6.6mg					
③ アロカリス パロノセトロン点滴バッグ	235mg	1V	235mg	235mg	/	30分/点滴
	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン 6.6mg	0.5V	3.3mg	3.3mg		
④ 生食	100ml	1V	/	/	/	15分/点滴
⑤ 生食	50ml	1V	/	/	/	5分/点滴
⑥ 生食	50ml	1V	/	/	/	5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分) (30分) (120分) (5分)

投与順番≫ ④ → ① → ⑤ → ③ → ② → ⑥ → 終了

【コメント】

S-1 : Day1~Day14 に併用 (2週服薬 1週休薬)

※1 S-1 投与量 : BSA 1.25 m²未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m²以上~1.5 m²未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m²以上 → 120mg/day

インラインフィルター付ルートを使用

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
オブジーボ 240mg/body	点滴	mg	↓	2週を1コース	↓
レボホリナート(L-LV) 200mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 400mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
エルプラット (L-OHP) 85mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 2400mg/m ²	持続 注入	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	2週を1コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑

↑ 患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
① オブジーボ	240mg			mg	生食 100mL	30分/点滴
② レボホリナート	25mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	120分/点滴
	100mg					
③ フルオロウラシル bolus	250mg			mg	ブドウ糖 5%100mL	5分/点滴
	1000mg					
④ フルオロウラシル 持続	250mg			mg	生食適量	46hr 持続注入
	1000mg					
⑤ エルプラット	100mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	120分/点滴
⑥	アロカリス	235mg	1V	235mg		30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg		
⑦ 生食	100ml	1V				15分/点滴
⑧ 生食	50ml	1V				5分/点滴

投与間隔>> (15分) (30分) (5分) (30分) ② (120分) (5分) 46時間 (持続注入)

投与順番>> ⑦ → ① → ⑧ → ⑥ → ⑤ → ③ → ④ → 終了

【コメント】

インラインフィルター付ルートを使用

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

◇レジメン No.06018 《胃癌：Nivo+XELOX》 外科

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	2~14	…Day21	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓		3週1コース	↓
エルプラット (I-OHP) 130mg/m ²	点滴	mg	↓			↓
ゼローダ 2000mg/m ²	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		3週1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑			↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法	
① オプジーボ	240mg	/	/	mg	生食 100mL	30分/点滴	
	120mg						
② エルプラット	100mg	/	/	mg	ブドウ糖 5%500mL	120分/点滴	
	デカドロン 6.6mg						0.5A
③ アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg	/	30分/点滴	
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg			0.75mg
	デカドロン	6.6mg	0.5A	3.3mg			3.3mg
④ 生食	100ml	1V	/	/	/	15分/点滴	
⑤ 生食	50ml	1V	/	/	/	5分/点滴	
⑥ 生食	50ml	1V	/	/	/	5分/点滴	

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分) (30分) (120分) (5分)

投与順番≫ ④ → ① → ⑤ → ③ → ② → ⑥ → 終了

【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

※ゼローダ (カペシタビン) は処方入力。

ゼローダ用法 (C法) : 1日2回朝・夕食後、14日投薬7日休薬

ゼローダ投与量 (C法) BSA < 1.36 m² : 2400mg/day

1.36 m² ≤ BSA < 1.66 m² : 3000mg/day

1.66 m² ≤ BSA < 1.96 m² : 3600mg/day

1.96 m² ≤ BSA : 4200mg/day