

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
レボホリナート(I-LV) 200mg/m ²	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
エルプラット(I-OHP) 85mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 180mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
5-FU 400mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
5-FU 2400mg/m ²	持続注入	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	2週間を1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート	25mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	120分/点滴
	100mg					
②エルプラット	100mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	120分/点滴
③トポテシン	40mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	90分/点滴
	100mg					
④フルオロウラシル bolus	250mg			mg	ブドウ糖 5%100mL	5分/点滴
⑤フルオロウラシル 持続	250mg			mg	生食適量	46hr 持続注入
⑥	アロカリス	235mg	1V	235mg	mg	30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg		

投与間隔》

①

(120分)

(30分)

(120分)

(90分)

(5分)

46時間

投与順番》

⑥

→

②

→

③

→

④

→

⑤

→

終了

【コメント】

※イメンド併用(プロイメンド又は内服3日間)

UGT1A1の検査オーダーが出されているか確認

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
レボホリナート(l-LV) 200mg/m ²	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
エルプラット(l-OHP) 85mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 150mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5-FU) 2400mg/m ²	持続注入	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	2週間を1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法	
①レボホリナート	25mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	120分/点滴	
	100mg						
②エルプラット	100mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	120分/点滴	
③トポテシン	40mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	90分/点滴	
	100mg						
④フルオロウラシル 持続	250mg			mg	生食適量	46hr 持続注入	
⑤	アロカリス	235mg	1V	235mg		30分/点滴	
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg			0.75mg
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg			9.9mg

投与間隔》

①

(120分)

投与順番》

(30分)

(120分)

(90分)

46時間

⑤

②

③

④

終了

【コメント】

※イメンド併用(プロイメンド又は内服3日間)

UGT1A1の検査オーダーが出されているか確認

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day28	Day1 (/)
アブラキサン (nab-PTX) 125mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	4週1コース	↓
ジェムザール(GEM) 1,000mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	↑	↑	4週1コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑		↑

《薬剤調製》

↑ 患者投与量との一致を確認！

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①アブラキサン	100mg	 	 	 mg	生食 100mL	30分/点滴
②ジェムザール	200mg	 	 	 mg	生食 100mL	30分/点滴
	1000mg	 	 			
③	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	 	15分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg		
④生食	50ml	1V	 	 	 	5分/点滴
⑤生食	50ml	1V	 	 	 	5分/点滴
⑥生食	50ml	1V	 	 	 	5分/点滴

投与間隔>> (15分) (5分) (30分) (5分) (30分) (5分)

投与順番>> ③ → ④ → ① → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【コメント】 インラインフィルター付きルートは使用しないこと

調製：アブラキサン 1Vあたり、生食 20mlで溶解したあと、生食のボトルを空にすること

(溶解し、採取したアブラキサンは生食で薄めないこと)

◇レジメン No.08004 《胆道癌：GEM+CDDP》 外科

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
シスプラチン(CDDP) 25mg/m ²	点滴	mg	↓		↓	3週1コース	↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑	3週1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑		↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑		↑		↑
フロセミド 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
① シスプラチン	10mg			mg	生食 400ml	60分/点滴
	25mg					
② ジェムザール	200mg			mg	生食 100ml	30分/点滴
	1000mg					
③	アロカリス	1V	235mg	235mg		30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	1V	6.6mg	6.6mg		
④	硫酸 Mg	0.4A	0.4A	0.4A	生食 500ml	60分/点滴
⑤	フロセミド	0.5A	0.5A	10mg	生食 250ml	30分/点滴
⑥	生食	1V				60分/点滴

投与間隔≫ (30分) (30分) (60分) (30分) (60分) (60分) 終

投与順番≫ ③ → ② → ④ → ⑤ → ① → ⑥ → 了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	2~7	Day8 (/)	9~14	…Day21	Day1 (/)
ジェムザール(GEM) 1,000mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		3週を1コース	↓
エスワンタイホウ ※下記参照	内服	mg	↓	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑		3週を1コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑			↑

患者投与量との一致を確認!

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg			mg	生食 100mL	30分/点滴
	1,000mg					
② グラニセトロン点滴バッグ デカドロン	1mg	1V	1mg	1mg		15分/点滴
	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
③ 生食	50mL	1V				5分/点滴

投与間隔>> (15分) (30分) (5分)
 投与順番>> ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

※エスワンタイホウ (S-1) は処方入力。(術前の S-1+GEM とは用量が異なる)

S-1 : 1日2回朝・夕食後、14日投薬7日休薬

S-1 投与量 BSA < 1.25 m² : 60mg/day

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 80mg/day

1.5 m² ≤ BSA : 100mg/day

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day28	Day1 (/)
ジェムザール(GEM) 1,000mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	4週を1コース	↓

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	↑	↑	4週を1コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg	200mg	200mg	mg	生食 100mL	30分/点滴
	1,000mg	1,000mg	1,000mg			
② グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15分/点滴
デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
③ 生食	50mL	1V				5分/点滴

投与間隔>> (15分) (30分) (5分)
 投与順番>> ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

※エルロチニブ : 1日1回 食間 100mg/日 服用 (休薬なし)

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day14	Day1 (/)
レボホリナート(L-LV) 200mg/m ²	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
オニバイド(nal-IRI) 70mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 2400mg/m ²	持続 注入	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	2週間を1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート	25mg	/	/	mg	ブドウ糖 5%250mL	120分/点滴
	100mg					
②フルオロウラシル 持続	250mg	/	/	mg	生食適量	46hr 持続注入
③オニバイド	43mg	/	/	mg	ブドウ糖 5%500mL	90分/点滴
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	/	30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg		
⑤ 生食	50mL	1V	/	/	/	5分/点滴

投与間隔≫ (30分) (90分) (5分) (120分) 46時間 (持続注入)

投与順番≫ ④ → ③ → ⑤ → ① → ② → 終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2-7	・・・Day14	Day1 (/)
シスプラチン(CDDP) 25mg/m ²	点滴	mg	↓		2週1コース	↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓			↓
エスワンタイホウ ※下記参照	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		2週1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑			↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑			↑
フロセミド 10mg/body	点滴	10mg	↑			↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法	
① シスプラチン	10mg	 	 	mg	生食 400ml	60分/点滴	
	25mg	 	 				
	50mg	 	 				
② ジェムザール	200mg	 	 	mg	生食 100ml	30分/点滴	
	1000mg	 	 				
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	30分/点滴		
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg			
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg			
④	硫酸 Mg	20mL	0.4A	0.4A	0.4A	生食 500ml	60分/点滴
⑤	フロセミド	20mg	0.5A	0.5A	10mg	生食 250ml	30分/点滴
⑥	生食	500mL	1V				60分/点滴

投与間隔>> (30分) (30分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番>> ③ → ② → ④ → ⑤ → ① → ⑥ → 終了

【コメント】

・ S-1 内服を Day1~Day7 に併用

・ S-1 投与量： BSA 1.25 m²未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m²~1.5 m²未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m²以上 → 120mg/day

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	2~7	Day8 (/)	9~14	…Day21	Day1 (/)
ジェムザール(GEM) 1,000mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		3週を1コース	↓
エスワンタイホウ ※下記参照	内服	mg	↓	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑		3週を1コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑			↑

患者投与量との一致を確認!

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg			mg	生食 100mL	30分/点滴
	1,000mg					
② グラニセトロン点滴バッグ デカドロン	1mg	1V	1mg	1mg		15分/点滴
	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
③ 生食	50mL	1V				5分/点滴

投与間隔>> (15分) (30分) (5分)

投与順番>> ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

※エスワンタイホウ (S-1) は処方入力。(進行・再発の S-1+GEM とは用量が異なる)

S-1 : 1日2回朝・夕食後、14日投薬7日休薬

S-1 投与量 BSA < 1.25 m² : 80mg/day1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100mg/day1.5 m² ≤ BSA : 120mg/day

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	mg	↓			3週1コース	↓
シスプラチン(CDDP) 25mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑	3週1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑		↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑		↑		↑
フロセミド 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
① イミフィンジ	500mg	500mg	500mg	1500mg	生食 100ml	60分/点滴
② シスプラチン	10mg	10mg	10mg	mg	生食 400ml	60分/点滴
	25mg	25mg	25mg			
③ ジェムザール	200mg	200mg	200mg	mg	生食 100ml	30分/点滴
	1000mg	1000mg	1000mg			
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	30分/点滴	30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg		
⑤ 硫酸 Mg	20mL	0.4A	0.4A	0.4A	生食 500ml	60分/点滴
⑥ フロセミド	20mg	0.5A	0.5A	10mg	生食 250ml	30分/点滴
⑦ 生食	100mL	1V	100mL	100mL	100mL	15分/点滴
⑧ 生食	50mL	1V	50mL	50mL	50mL	5分/点滴
⑨ 生食	500mL	1V	500mL	500mL	500mL	60分/点滴

投与間隔≫ (15分) (60分) (5分) (30分) (30分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番≫ ⑦ → ① → ⑧ → ④ → ③ → ⑤ → ⑥ → ② → ⑨ → 終了

【コメント】

イミフィンジはインラインフィルター付きルートを使用

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day28	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	mg	↓	4週1コース	↓

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
① イミフィンジ	500mg			1500mg	生食 100ml	60分/点滴
② 生食	100mL	1V				15分/点滴
③ 生食	50mL	1V				5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (60分) (5分)

投与順番≫ ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

イミフィンジはインラインフィルター付きルートを使用

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	2~7	Day8 (/)	9~21	…Day35	Day1 (/)
シスプラチン(CDDP) 35mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		5週を1コース	↓
エスワンタイホウ ※下記参照	内服	mg	↓	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑		5週を1コース	↑
------------------------	----	--------	---	--	---	--	---------	---

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①シスプラチン	10mg			mg	生食 450mL	6時間/点滴
	25mg					
②	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg		15分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg		
③	生食	50mL	1V			5分/点滴

投与間隔> (15分) (6時間) (5分)

投与順番> ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

※エスワンタイホウ (S-1) は処方入力。

S-1 : 1日2回朝・夕食後、21日投薬14日休薬

S-1 投与量 BSA < 1.25 m² : 80mg/day1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100mg/day1.5 m² ≤ BSA : 120mg/day