

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…14	Day1 (/)
オブジーボ 240mg/body	点滴	mg	↓	2 週 1 コース	↓

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15 分/点滴
②オプジーボ	240mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
③生食	50ml	1V				5 分/点滴

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (5 分)

投与順番≫ ① → ② → ③ → 終了

【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

[illegible]

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓	3 週 1 コース	↓

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15 分/点滴
②キイトルーダ	100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
③生食	50ml	1V				5 分/点滴

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (5 分)

投与順番≫ ① → ② → ③ → 終了

【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

[illegible]

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…42	Day1 (/)
キイトルーダ 400mg/body	点滴	mg	↓	6 週 1 コース	↓

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15 分/点滴
②キイトルーダ	100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
③生食	50ml	1V				5 分/点滴


投与間隔≫ (15 分) (30 分) (5 分)

投与順番≫ ① → ② → ③ → 終了

【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

This image shows a blank sheet of white paper with ten horizontal dashed lines spaced evenly apart, resembling notebook paper. The lines are light gray and extend across the full width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…21	Day1 (/)
テセントリク 1200mg/body	点滴	mg	↓	3 週 1 コース	↓



薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15 分/点滴
②テセントリク	1200mg			mg	生食 250mL	下記参照/点滴
③生食	50ml	1V				5 分/点滴

投与間隔≫

(15 分)

(※下記参照)

(5 分)

投与順番≫

①

→

②

→

③

→

終了

【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

※初回 60 分／2 回目以降 30 分まで短縮可能

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)		Day15 (/)	・ ・ Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓					3 週 1 コース	↓
アブラキサン(nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓		↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓						↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑					3 週 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑						↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑						↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg			↑		↑		
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg			↑		↑		

↑ 患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
① キイトルーダ		100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
② アブラキサン		100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
③ カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
⑤	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		
⑥	生食	50mL					5 分/点滴
⑦	生食	50mL					5 分/点滴
⑧	生食	50mL					5 分/点滴

(day1)

投与 間隔》	(30 分)	(30 分)	(5 分)	(30 分)	(5 分)	(60 分)	(5 分)	
投与 順番》	④	→ ①	→ ⑥	→ ②	→ ⑦	→ ③	→ ⑧	→ 終了

(day8、15)

投与間隔》	(15 分)	(5 分)	(30 分)	(5 分)	
投与順番》	⑤	→ ⑥	→ ②	→ ⑦	→ 終了

【コメント】 ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

- ・調製：アブラキサン 1V あたり、生食 20ml で溶解したあと、生食のボトルを空にすること
- (溶解し、採取したアブラキサンは生食で薄めないこと)
- ・メインルートはインラインフィルター付ルートを使用
- ・アブラキサンはインラインフィルター付ルート使用不可

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	・・Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓
(支持療法)					
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ		100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
②ペメトレキセド		100mg 500mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
③カルボプラチン		50mg 150mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
⑤ 生食		50mL					5 分/点滴

投与時間》(30 分)(30 分)(10 分)(60 分)(5 分)

投与順》④ → ① → ② → ③ → ⑤ → 終了

【コメント】 ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

・インラインフィルター付ルートを使用

・投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、

投与最終日から 22 日目まで継続する。

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	・・Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
シスプラチン(CDDP) 75mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
(支持療法)					
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑		↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ		100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
②ペメトレキセド		100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
③シスプラチン		10mg			mg	生食 300mL	60 分/点滴
		25mg					
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
⑤	硫酸マグネシウム	20mL	0.4A	0.4A	0.4A	生食 500mL	60 分/点滴
⑥	マンニトール	300mL	0.67V	200mL	200mL		30 分/点滴
⑦	生食	500mL					60 分/点滴

投与時間≫ (30 分) (30 分) (10 分) (60 分) (30 分) (60 分) (60 分)

投与順≫ ④ → ① → ② → ⑤ → ⑥ → ③ → ⑦ → 終了

【コメント】 ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

・インラインフィルター付ルートを使用

・投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバル 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、
投与最終日から 22 日目まで継続する。

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ		100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
②ペメトレキセド		100mg 500mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
③	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
④	生食	50mL					5 分/点滴

投与時間≫ (15 分) (30 分) (10 分) (5 分)

投与順≫ ③ → ① → ② → ④ → 終了

【コメント】

- ・インラインフィルター付ルートを使用
- ・投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、投与最終日から 22 日目まで継続する。

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	…21	Day1 (/)
テセントリク 1200mg/body	点滴	mg	↓			3 週 1 コース	↓
エトポシド (VP-16) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5：Calvert 式)	点滴	mg	↓				↓

支持療法

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑			3 週 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑				↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑				↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg		↑	↑		

《薬剤調製》

患者投与量との一致を確認！

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
① テセントリク		1200mg			1200mg	生食 250mL	下記参照/点滴
② エトポシド		100mg			mg	生食 500mL	90 分/点滴
③ カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ Day1	0.75mg	1A	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン Day1	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
⑤ デカドロン Day2,3		6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg	生食 100mL	15 分/点滴
⑥ 生食		50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔》 (30 分) (※1) (90 分) (60 分) (5 分)

投与順番》 ④ → ① → ② → ③ → ⑥ → 終了

《Day2,3》

投与間隔》 (15 分) (90 分) (5 分)

投与順番》 ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

※1 テセントリク 初回 60 分／2 回目以降 30 分

テセントリクはインラインフィルター付きルートを使用

◇レジメン No.01011 《非小細胞肺癌：Atezo+アバ`スチン+CBDCA+PTX（ABCP）療法

Atezo+へ`バシズマブ` BS+CBDCA+PTX（ABCP）療法》呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…21	Day1 (/)
テセントリク 1200mg/body	点滴	mg	↓	3 週 1 コース	↓
パクリタキセル(PTX) 175mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓
アバスチン or ベバシズマブ BS(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

支持療法

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週 1 コース	↑
デカドロン 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑		↑
ガスター 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑

《薬剤調製》

患者投与量との一致を確認！

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①テセントリク		1200mg			1200mg	生食 250mL	下記参照/点滴
②パクリタキセル		30mg			mg	生食 500mL	180 分/点滴
		100mg					
③カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
④アバスチン、へ`バシズマブ` BS		100mg			mg	生食 100mL	下記参照/点滴
		400mg					
⑤	デカドロン	6.6mg	3A	19.8mg	19.8mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ガスター	20mg	1A	20mg	20mg		
	ネオレスタール	10mg	1A	10mg	10mg		
⑥	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1A	1mg	1mg		
⑦	生食	100mL	1V				15 分/点滴
⑧	生食	50mL	1V				5 分/点滴
⑨	生食	50mL	1V				5 分/点滴

投与間隔》(15 分)(※ 1)(5 分)(※ 2)(15 分)(30 分)(180 分)(60 分)(5 分)

投与順番》⑦ → ① → ⑧ → ④ → ⑤ → ⑥ → ② → ③ → ⑨ → 終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

※1 テセントリク 初回 60 分／2 回目以降 30 分

※2 アバスチン、ベバシズマブ BS 初回 90 分／2 回目 60 分／3 回目以降 30 分

テセントリク・パクリタキセルはインラインフィルター付きルートを使用

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…21	Day1 (/)
テセントリク 1200mg/body	点滴	mg	↓	3 週 1 コース	↓
アバスチン、 ベバシズマブ BS(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

《薬剤調製》

患者投与量との一致を確認！

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①テセントリク		1200mg			1200mg	生食 250mL	下記参照/点滴
②	アバスチン、ベバシズマブ BS	100mg			mg	生食 100mL	下記参照/点滴
		400mg					
③	生食	100mL	1V				15 分/点滴
④	生食	50mL	1V				5 分/点滴
⑤	生食	50mL	1V				5 分/点滴

投与間隔》 (15 分) (※ 1) (5 分) (※ 2) (5 分)

投与順番》 ③ → ① → ④ → ② → ⑤ → 終了

【コメント】

※1 テセントリク 初回 60 分／2 回目以降 30 分

※2 アバスチン、ベバシズマブ BS 初回 90 分／2 回目 60 分／3 回目以降 30 分

・テセントリクはインラインフィルター付きルートを使用

◇レジメン No.01013 《小細胞肺癌：イミフィンジ+CBDCA+エトポシド（>30kg）》 呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	・・・21	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	mg	↓			3 週 1 コース	↓
エトポシド (VP-16) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5：Calvert 式)	点滴	mg	↓				↓

支持療法

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑			3 週 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑				↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑				↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg		↑	↑		

《薬剤調製》

患者投与量との一致を確認！

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①イミフィンジ		120mg			1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
		500mg					
②エトポシド		100mg			mg	生食 500mL	90 分/点滴
③カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1A	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
⑤	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg	生食 100mL	15 分/点滴
⑥	生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔≫ (30 分) (60 分) (90 分) (60 分) (5 分)

投与順番≫ ④ → ① → ② → ③ → ⑥ → 終了

《Day2,3》

投与間隔≫ (15 分) (90 分) (5 分)

投与順番≫ ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【コメント】

イミフィンジはインラインフィルター付きルートを使用

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

体重>30kg であることを確認

◇レジメン No.01014 《小細胞肺癌：イミフィンジ維持療法（小細胞）（＞30kg）》 呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…28	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	1500mg	↓	4 週 1 コース	↓

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15 分/点滴
②イミフィンジ	500mg			1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
③生食	50ml	1V				5 分/点滴

投与間隔≫ (15 分) (60 分) (5 分)

投与順番≫ ① → ② → ③ → 終了

【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

◇レジメン No.01015 《非小細胞肺癌：イミフィンジ（化学放射線療法後）（＞30kg）》 呼吸器内科

薬品名 投与量/体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…28	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	1500mg	↓	4 週 1 コース	↓

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15 分/点滴
②イミフィンジ	500mg			1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
③生食	50ml	1V				5 分/点滴


投与間隔≫ (15 分) (60 分) (5 分)

投与順番≫ ① → ② → ③ → 終了

【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

投与期間は 12 ヶ月以内

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…14	Day1 (/)
イミフィンジ 10mg/kg	点滴	mg	↓	2 週 1 コース	↓



薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15 分/点滴
②イミフィンジ	120mg 500mg			mg	生食 100mL	60 分/点滴
③生食	50ml	1V				5 分/点滴

投与間隔≫

(15 分)

(60 分)

(5 分)

投与順番≫

①

→

②

→

③

→

終了

【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

投与期間は 12 ヶ月以内

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day22 (/)		・・・Day42	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓		↓		6 週間を 1 コース	↓
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓					↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓			↓
シスプラチン(CDDP) 75mg/m ²	点滴	mg	↓		↓			↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑		6 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑			↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑			↑
硫酸マグネシウム 0.4A /body	点滴	0.4A	↑		↑			↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑		↑			↑

《薬剤調製》

患者投与量との一致を確認！

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①オプジーボ		120mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
		240mg					
②ヤーボイ		50mg			mg	生食 50mL	30 分/点滴
③ペメトレキセド		100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
④シスプラチン		10mg			mg	生食 300mL	60 分/点滴
		25mg					
⑤	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
⑥	硫酸マグネシウム	20mL	0.4A	0.4A	0.4A	生食 500mL	60 分/点滴
⑦	マンニトール	300mL	0.67V	200mL	200mL		30 分/点滴
⑧	生食	100mL	1V				15 分/点滴
⑨	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑩	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑪	生食	500mL	1V				60 分/点滴

《Day1》

投与間隔》 (15 分) (30 分) (30 分) (30 分) (30 分)

投与順番》 ⑧ → ① → ⑨ → ② → ⑩ →

《Day22》

(30 分) (10 分) (60 分) (30 分) (60 分) (60 分)

⑤ → ③ → ⑥ → ⑦ → ④ → ⑪ → 終了

投与間隔》 (15 分) (30 分) (30 分) (30 分) (10 分) (60 分) (30 分) (60 分) (60 分)

投与順番》 ⑧ → ① → ⑨ → ⑤ → ③ → ⑥ → ⑦ → ④ → ⑪ → 終了

【コメント】

- ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認
- ・インラインフィルター付ルートを使用
- ・投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバル 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、
投与最終日から 22 日目まで継続する。

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day22 (/)		・・・Day42	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓		↓		6 週間を 1 コース	↓
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓					↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓			↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓			↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑		6 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑			↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑			↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①オプジーボ		120mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
		240mg					
②ヤーボイ		50mg			mg	生食 50mL	30 分/点滴
③ペメトレキセド		100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
④カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
⑤	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
⑥ 生食		100mL	1V				15 分/点滴
⑦ 生食		100mL	1V				30 分/点滴
⑧ 生食		100mL	1V				30 分/点滴
⑨ 生食		50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与
間隔》

15 分30 分30 分30 分30 分30 分10 分60 分5 分

投与
順番》⑥→①→⑦→②→⑧→⑤→③→④→⑨→終了

《Day22》

投与間隔》

(15 分)(30 分)(30 分)(30 分)(10 分)(60 分)(5 分)

投与順番》⑥→①→⑦→⑤→③→④→⑨→終了

【コメント】

- ・インラインフィルター付ルートを使用
- ・投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバル 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、
投与最終日から 22 日目まで継続する。
- ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day22 (/)		・・・Day42	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓		↓		6 週間を 1 コース	↓
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓					↓
パクリタキセル(PTX) 200mg/m ²	点滴	mg	↓		↓			↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓			↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑		6 週間を 1 コース	↑
デカドロン 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑		↑			↑
ガスター 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑			↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑			↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑			↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①オプジーボ		120mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
		240mg					
②ヤーボイ		50mg			mg	生食 50mL	30 分/点滴
③パクリタキセル		30mg			mg	生食 500mL	3 時間/点滴
		100mg					
④カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
⑤	デカドロン	6.6mg	3A	19.8mg	19.8mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ガスター	20mg	1A	20mg	20mg		
	ネオレスタール	10mg	1A	10mg	10mg		
⑥	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		
⑦	生食	100mL	1V				15 分/点滴
⑧	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑨	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑩	生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔》(15 分)(30 分)(30 分)(30 分)(30 分)

投与順番》⑦→①→⑧→②→⑨→

(15 分)(30 分)(3 時間)(60 分)(5 分)

⑤→⑥→③→④→⑩→ 終了

《Day22》

投与
間隔》15 分30 分30 分15 分30 分3 時間60 分5 分

投与
順番》⑦→①→⑧→⑤→⑥→③→④→⑩→ 終了

【コメント】

- ・インラインフィルター付ルートを使用
- ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	Day22 (/)	…42	Day1 (/)
オブジーボ 360mg/body	点滴	360mg	↓	↓	6 週 1 コース	↓
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓			↓

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15 分/点滴
②オプジーボ	240mg	360mg	360mg	360mg	生食 100mL	30 分/点滴
	120mg					
③生食	100ml	1V				30 分/点滴
④ヤーボーイ	50mg	V	mg	mg	生食 50mL	30 分/点滴
⑤生食	50ml	1V				5 分/点滴

 $\langle \text{day1} \rangle$

投与間隔≫ (15分) (30分) (30分) (30分) (5分)

投与順番≫ ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → 終了

 $\langle \text{day22} \rangle$

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (5 分)

投与順番≫ ① → ② → ⑤ → 終了

【コメント】 インラインフィルタ付ルートを使用

[illegible]

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	…Day21	Day1 (/)
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=5：Calvert 式)	点滴	mg	↓			3 週を 1 コース	↓
エトポシド (VP-16) 100mg/ m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑			3 週を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑				↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑				↑
デカドロン 6.6mg/body		6.6mg		↑	↑		

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
① カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	60 分/点滴
		150mg					
② エトポシド		100mg	V	mg	mg	生食 500mL	90 分/点滴
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
④ デカドロン		6.6mL	1V	6.6mg	6.6mg	生食 100mL	15 分/点滴
⑤ 生食		50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔》 (30 分) (90 分) (60 分) (5 分)

投与順番》 ③ → ② → ① → ⑤ → 終了

《Day2,3》

投与間隔》 (15 分) (90 分) (5 分)

投与順番》 ④ → ② → ⑤ → 終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

75 歳以上：エトポシドの投与量を 80mg/m²。

80 歳以上：カルボプラチン投与量を AUC 4

◇レジメン No.01021 《非小細胞肺癌：CBDCA+PEM+アバ`スチン、CBDCA+PEM+べ`バシズ`マブ` BS》呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓
アバスチン、 ベバシズマブ BS(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9 mg	↑		↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド		100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
②カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
③アバスチン、べ`バシズ`マブ` BS		100mg			mg	生食 100mL	下記参照/点滴
		400mg					
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
⑤	生食	50mL					5 分/点滴

投与時間 (※下記参照) (30 分) (10 分) (60 分) (5 分)
投与順≫ ③ → ④ → ① → ② → ⑤ → 終了

【コメント】

※アバスチン、ベバシズマブ BS 初回 90 分／2 回目 60 分／3 回目以降 30 分

投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、
投与最終日から 22 日目まで継続する。

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド		100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
②カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
④	生食	50 mL					5 分/点滴

投与時間》 (30 分) (10 分) (60 分) (5 分)

投与順》 ③ → ① → ② → ④ → 終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、


投与最終日から 22 日目まで継続する。

◇レジメン No.01023 《非小細胞肺癌：CBDCA+PTX+アバ`スチン、CBDCA+PTX+べ`バシズマブ BS 》呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…21	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 200mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週 1 コース	↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓
アバスチン、 ベバシズマブ BS(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

支持療法

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週 1 コース	↑
デカドロン 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑		↑
ガスター 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑



《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①	パクリタキセル	30mg			mg	生食 500mL	180 分/点滴
		100mg					
②	カルボプラチン	50mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	60 分/点滴
		150mg					
③	アバスチン、べバシズマブ BS	100mg			mg	生食 100mL	下記参照/点滴
		400mg					
④	デカドロン	6.6mg	3 A	19.8mg	19.8 mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ガスター	20mg	1 A	20 mg	20 mg		
	ネオレスタール	10mg	1 A	10 mg	10 mg		
⑤	アロカリス	235mg	1 V	235mg	235mg		30 分/点滴
	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1 V	1 mg	1 mg		
⑥	生食	50mL	1 V				5 分/点滴

投与間隔》 (下記参照) (15 分) (30 分) (180 分) (60 分) (5 分)

投与順番》 ③ → ④ → ⑤ → ① → ② → ⑥ → 終了

【コメント】

パクリタキセルはインラインフィルター付きルート使用

アバスチン、ベバシズマブ BS 初回 90 分／2 回目 60 分／3 回目以降 30 分


アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

◇レジメン No.01024 《非小細胞肺癌：CBDCA+PTX》呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…21	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 200mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週 1 コース	↓
カルボプラチン (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓


支持療法

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週 1 コース	↑
デカドロン 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑		↑
ガスター 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑



《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル		30mg			mg	生食 500mL	180 分/点滴
		100mg					
②カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
③	デカドロン	6.6mg	3 A	19.8 mg	19.8 mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ガスター	20mg	1 A	20 mg	20 mg		
	ネオレスタール	10mg	1 A	10 mg	10 mg		
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1 V	1mg	1mg		
⑤	生食	50mL	1 V				5 分/点滴



【コメント】

パクリタキセルはインラインフィルター付きルート使用

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)		Day15 (/)	・ ・ Day21	Day1 (/)
アブラキサン(nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓	3 週 1 コース	↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6 : Calvert 式)	点滴	mg	↓						↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑					3 週 1 コース	↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑						↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg			↑		↑		
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑						↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg			↑		↑		

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①アブラキサン		100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
②カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
④	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		
⑤	生食	50ml	1V				5 分/点滴

(day1)

投与間隔》 (30 分) (5 分) (30 分) (5 分) (60 分) (5 分)

投与順番》 ③ → ⑤ → ① → ⑤ → ② → ⑤ → 終了

(day8、15)

投与間隔》 (15 分) (5 分) (30 分) (5 分)

投与順番》 ④ → ⑤ → ① → ⑤ → 終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)		Day15 (/)	…Day28	Day1 (/)
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5：Calvert 式)	点滴	mg	↓					4 週間を 1 コース	↓
トポテシン(CPT-11) 50mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑					4 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑		↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑						↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg			↑		↑		

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①	カルボプラチン	50mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	60 分/点滴
		150mg					
②	トポテシン	40mg			mg	生食 500mL	90 分/点滴
		100mg					
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
④	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
⑤	生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与時間》(30 分)(90 分)(60 分)(5 分)

投与順》③ → ② → ① → ⑤ → 終了

《Day8,15》

投与時間》(15 分)(90 分)(5 分)

投与順》④ → ② → ⑤ → 終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

80 歳以上では、CBDCA (AUC 4)、CPT-11 (40mg/m²)

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)	…Day21	Day1 (/)
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5：Calvert 式)	点滴	mg	↓			3 週間を 1 コース	↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑			3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑				↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg			↑		
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑				↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg			↑		

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①	カルボプラチン	50mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	60 分/点滴
		150mg					
②	ジェムザール	200mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
		1000mg					
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
④	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
⑤	生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与時間》 (30 分) (30 分) (60 分) (5 分)

投与順》 ③ → ② → ① → ⑤ → 終了

《Day8,15》

投与時間》 (15 分) (30 分) (5 分)

投与順》 ④ → ② → ⑤ → 終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

80 歳以上では、CBDCA（AUC 4）、CPT-11（40mg/m²）

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5：Calvert 式)	点滴	mg	↓	3 週を 1 コース	↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5%250mL	60 分/点滴
		150mg					
②	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
③	生食	50mL	1V				5 分/点滴

投与時間≫ (30 分) (60 分) (5 分)

投与順≫ ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

・ S-1 内服を Day1～Day14 に併用

・ S-1 投与量：BSA 1.25 m²未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m²～1.5 m²未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m²～ → 120mg/day

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・21	Day1 (/)
ドセタキセル(DTX) 60mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週 1 コース	↓
サイラムザ 10mg/kg	点滴	mg	↓		↓

支持療法

デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	3 週 1 コース	↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑

《薬剤調製》

患者投与量との一致を確認！

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①サイラムザ		100mg			mg	生食 250mL	60 分/点滴
		500mg					
②ドセタキセル		20mg			mg	生食 250mL	60 分/点滴
		80mg					
③	デカドロン	6.6mg	1 V	6.6 mg	6.6 mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ネオレスタール	10mg	1 A	10 mg	10 mg		
④	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1 V	1mg	1mg		30 分/点滴
⑤	生食	250mL	1 V				60 分/点滴
⑥	生食	50mL	1 V				5 分/点滴

投与間隔》

(15 分) (30 分) (60 分) (60 分) (60 分) (5 分)

投与順番》

③ → ④ → ① → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【コメント】

サイラムザはインラインフィルター付きルート使用

サイラムザ投与後の⑤生食(250mL)は 1・2 コース目のみ(3 コース以降は不要)

◇レジメン No.01030 《非小細胞肺癌：CDDP+PEM+アバ`スチン-SH、
CDDP+PEM+べ`バシズ`マブ` BS-SH》呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
シスプラチン(CDDP) 75 mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
アバスチン、 ベバシズマブ BS(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9 mg	↑		↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A /body	点滴	0.4A	↑		↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド		100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
②シスプラチン		10mg			mg	生食 300mL	60 分/点滴
		25mg					
③アバスチン、べ`バシズ`マブ` BS		100mg			mg	生食 100mL	下記参照/点滴
		400mg					
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
	パ`ロ`セ`ト`ロ`ン点滴`バ`グ`	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
⑤	硫酸マグネシウム		0.4A	0.4A	0.4A	生食 500mL	60 分/点滴
⑥	マンニトール	300mL	200mL	200mL	200mL		30 分/点滴
⑦	生食	500mL					60 分/点滴

投与時間 ※下記参照 30 分 10 分 60 分 30 分 60 分 60 分
投与順≫ ③ → ④ → ① → ⑤ → ⑥ → ② → ⑦ → 終了

【コメント】

※アバスチン、ベバシズマブ BS 初回 90 分／2 回目 60 分／3 回目以降 30 分

投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、
投与最終日から 22 日目まで継続する。

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・ ・ Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
シスプラチン(CDDP) 75mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A /body	点滴	0.4A	↑		↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド		100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
②シスプラチン		10mg			mg	生食 300mL	60 分/点滴
		25mg					
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
④	硫酸マグネシウム		0.4A	0.4A	0.4A	生食 500mL	60 分/点滴
⑤	マンニトール	200mL	0.67V	200mL	200mL		30 分/点滴
⑥	生食	500mL	1V				60 分/点滴

投与間隔≫ (30 分) (10 分) (60 分) (30 分) (60 分) (60 分)

投与順番≫ ③ → ① → ④ → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【コメント】

投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、

投与最終日から 22 日目まで継続する。

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ロゼウス(VNR) 25mg/m ²	点滴	mg	↓		↓	3 週間を 1 コース	↓
シスプラチン(CDDP) 80mg/m ²	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑			3 週間を 1 コース	↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑				↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg			↑		
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑				↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg			↑		
硫酸マグネシウム 0.4A /body	点滴	0.4A	↑				↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑				↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①ロゼウス		10mg	V	mg	mg	生食 50mL	5 分/点滴
②シスプラチン		10mg			mg	生食 300mL	60 分/点滴
		25mg					
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
④	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		
⑤	硫酸マグネシウム		0.4A	0.4A	0.4A	生食 500mL	60 分/点滴
⑥	マンニトール	300mL	0.67V	200mL	200mL		30 分/点滴
⑦	生食	500mL	1V				60 分/点滴
⑧	生食	250mL	1V				30 分/点滴

Day1

投与間隔≫ (30 分) (5 分) (60 分) (30 分) (60 分) (60 分) 終
投与順番≫ ③ → ① → ⑤ → ⑥ → ② → ⑦ → 了

Day8

投与間隔≫ (15 分) (5 分) (30 分)
投与順番≫ ④ → ① → ⑧ → 終了

【コメント】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)		Day15 (/)	・ ・ Day28	Day1 (/)
トポテシン(CPT-11) 60mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓	4 週間を 1 コース	↓
シスプラチン(CDDP) 60mg/m ²	点滴	mg	↓						↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑					4 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑						↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑						↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg			↑		↑		
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg			↑		↑		
硫酸マグネシウム 0.4A /body	点滴	0.4A	↑						↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑						↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン		40mg			mg	生食 500mL	90 分/点滴
		100mg			mg		
②シスプラチン		10mg			mg	生食 350mL	60 分/点滴
		25mg					
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
④	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		
⑤	硫酸マグネシウム		0.4A	0.4A	0.4A	生食 500mL	60 分/点滴
⑥	マンニトール	300mL	200mL	200mL	200mL		30 分/点滴
⑦	生食	500mL	1V				60 分/点滴
⑧	生食	50mL	1V				5 分/点滴

(day1)

投与間隔≫ (30 分) (90 分) (60 分) (30 分) (60 分) (60 分)

投与順番≫ ③ → ① → ⑤ → ⑥ → ② → ⑦ → 終了

(day8・15)

投与間隔≫ (15 分) (90 分) (5 分)


投与順番≫ ④ → ① → ⑧ → 終了

【コメント】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
ドセタキセル(DTX) 60mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓


(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑



《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
① ドセタキセル		20mg			mg	生食 250mL	60 分/点滴
		80mg					
②	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		
③	生食	50mL					5 分/点滴




【コメント】 80 歳以上は DTX 50mg/m²とする

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間 1 コース	↓


(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	3 週間 1 コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑



《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①	ペメトレキセド	100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
②	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		
③	生食	50ml					5 分/点滴



【コメント】

投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバル 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、
投与最終日から 22 日目まで継続する。

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)		Day15 (/)	…Day28	Day1 (/)
トポテシン(CPT-11) 100mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓	4 週間を 1 コース	↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑		↑	4 週間を 1 コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑		↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《藥劑調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①	トポテシン	40mg			mg	生食 500mL	90 分/点滴
		100mg					
②	パロセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
③	生食	50ml					5 分/点滴

投与時間≫

(15 分)

(90 分)

(5 分)

投与順》

②

①

③

終了

【コメント】


This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day21	Day1 (/)
アブラキサン (nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	3 週 1 コース	↓

(支持療法)							
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	↑	↑	3 週 1 コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑		↑



薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①アブラキサン	100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
②グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		
③生食	50ml	1V				5 分/点滴



【コメント】 インラインフィルター付きルートは使用しないこと

調製：アブラキサン 1V あたり、生食 20ml で溶解したあと、生食のボトルを空にすること

(溶解し、採取したアブラキサンは生食で薄めないこと)

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	…Day21	Day1 (/)
エトポシド 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	3 週を 1 コース	↓

(支持療法)

デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑	3 週を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑				↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
① エトポシド	100mg	V	mg	mg	生食 500mL	90 分/点滴
②	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg		15 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg		
③ 生食	50ml	1V				5 分/点滴

投与間隔》 (15 分) (90 分) (5 分)

投与順番》 ② —————> ① —————> ③ —————> 終了

【コメント】

(支持療法)						
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑	3 週間を 1 コース
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑	

《藥劑調製》

投与速度≫ (15分) (5分) (30分)

投与順番≫ ② → ① → ③ → 終了


【コメント】

This image shows a full page of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page. There is no text or other markings on the paper.

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ジェムザール(GEM) 1,000mg/m ²	点滴	mg	↓		↓	3 週間を 1 コース	↓

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑	3 週間を 1 コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑		↑



《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール		200mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
		1000mg					
②	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
③	生食	50mL					5 分/点滴

投与速度》 (15 分) (30 分) (5 分)

投与順番》 ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

肺野への放射線治療より一ヶ月間隔をおくこと（放射線性肺臓炎の頻度を高める為）

◇レジメン No.01041 《小細胞肺癌：AMR》

呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	・・Day21	Day1 (/)
カルセド(AMR) 40mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	3 週間を 1 コース	↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑				↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《藥劑調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①カルセド		20mg	V	mg	mg	生食 50mL	5 分/点滴
②	パロセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		
③	生食	50mL					5 分/点滴

投与時間≫ (15 分) (5 分) (5 分)

投与順≫ ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

[illegible]

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	．．．Day21	Day1 (/)
ハイカムチン(NGT) 1mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	3 週間を 1 コース	↓

(支持療法)

デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑	↑	↑	3 週間を 1 コース	↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	↑	↑	↑	↑		↑

患者投与量との一致を確認!

《藥劑調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①ハイカムチン		1.1mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
②	グラセプトン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
③生食		50mL	1V				5 分/点滴

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (5 分)

投与順番≫ ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

[illegible]

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
アバスチン、 ベバシズマブ BS(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6 mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド		100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
②アバスチン、ベバシズマブ BS		100mg			mg	生食 100mL	下記参照/点滴
		400mg					
③	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		15 分/点滴
	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		
④	生食	50mL					5 分/点滴

投与時間≫

※下記参照

(15 分)

(10 分)

(5 分)

投与順≫

②

→

③

→

①

→

④

→

終了

【コメント】

※アバスチン、ベバシズマブ BS 初回 90 分／2 回目 60 分／3 回目以降 30 分

投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、
投与最終日から 22 日目まで継続する。

◇レジメン No.01044 《非小細胞肺癌：タルセバ+アバスチン、タルセバ+ベバシズマブ BS》呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…21	Day1 (/)
アバスチン、 ベバシズマブ BS (Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓	3 週 1 コース	↓

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①	アバスチン、ベバシズマブ BS	100mg			mg	生食 100ml	※下記参照 /点滴
		400mg					
②	生食	50ml	1V				5 分/点滴

投与間隔》 (※下記参照) (5 分)

投与順番》 ① → ② → 終了

【コメント】

※アバスチン、ベバシズマブ BS 初回 90 分／2 回目 60 分／3 回目以降 30 分

※エルロチニブ ： 1 日 1 回 食間 150mg/日 服用（休薬なし）

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	・ ・ Day21	Day1 (/)
エトポシド (VP-16) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	3 週間を 1 コース	↓
シスプラチン (CDDP) 80mg/m ²	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑			3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑				↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑				↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	9.9mg		↑	↑		
硫酸マグネシウム 0.4A /body	点滴	0.4A	↑				↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑				↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①エトポシド		100mg			mg	生食 500mL	90 分/点滴
②シスプラチン		10mg			mg	生食 300mL	60 分/点滴
		25mg					
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
④	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg	生食 100mL	15 分/点滴
⑤	硫酸マグネシウム		0.4A	0.4A	0.4A	生食 500mL	60 分/点滴
⑥	マンニトール	300mL	0.67V	200mL	200mL		30 分/点滴
⑦	生食	500mL	1V				60 分/点滴
⑧	生食	50mL	1V				5 分/点滴

(day1)

投与間隔≫

(30 分)

(90 分)

(60 分)

(30 分)

(60 分)

(60 分)

投与順番≫

③

→

①

→

⑤

→

⑥

→

②

→

⑦

→

終了

(day2、3)

投与間隔≫

(15 分)

(90 分)

(5 分)

投与順番≫

④

→

①

→

⑧

→

終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

75 歳以上：エトポシドの投与量を 80mg/m²。

80 歳以上：カルボプラチン投与量を AUC 4

◇レジメン No.01046 《非小細胞肺癌：イミフィンジ+イジュド+CBDCA+PEM（NSQ）>30kg》 呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
イジュド 75mg/body	点滴	mg	↓		↓
ペメトレキシド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
パロセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①イミフィンジ		500mg			1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
②イジュド		25mg			75mg	生食 100mL	60 分/点滴
③ペメトレキシド		100mg 500mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
④カルボプラチン		50mg 150mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
⑤	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
⑥	生食	100mL	1V				15 分/点滴
⑦	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑧	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑨	生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔》 (15 分) (60 分) (30 分) (60 分) (30 分)

投与順番》 ⑥ → ① → ⑦ → ② → ⑧ →

(30 分) (10 分) (60 分) (5 分)

⑤ → ③ → ④ → ⑨ → 終了

【コメント】

- ・インラインフィルター付ルートを使用
- ・投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、投与最終日から 22 日目まで継続する。
- ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)		Day15 (/)	Day21	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	mg	↓					3 週間を 1 コース	↓
イジュド 75mg/body	点滴	mg	↓						↓
アブラキサン (nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓						↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑					3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑						↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑						↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg			↑		↑		
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg			↑		↑		

《薬剤調製》

患者投与量との一致を確認！

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①イミフィンジ		500mg	3V	1500mg	1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
②イジュド		25mg	3V	75mg	75mg	生食 100mL	60 分/点滴
③アブラキサン		100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
④カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
⑤	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
⑥	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
⑦	生食	100mL	1V				15 分/点滴
⑧	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑨	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑩	生食	50mL	1V				5 分/点滴
⑪	生食	50mL	1V				5 分/点滴
⑫	生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔》(15 分)(60 分)(30 分)(60 分)(30 分)

投与順番》⑦→①→⑧→②→⑨→

⑤→⑩→③→⑪→④→⑫→終了

《Day8、15》

投与間隔》15 分5 分30 分5 分

投与順番》⑥→⑩→③→⑪→終了

【コメント】

- ・アブラキサンはアルブミン製剤のため、初回導入時に輸血同意書が必要。
- ・インラインフィルター付ルートを使用。アブラキサンはフィルター禁。
- ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認。

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)		Day21	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	mg	↓				3 週間を 1 コース	↓
イジュド 75mg/body	点滴	mg	↓					↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓		↓			↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5：Calvert 式)	点滴	mg	↓					↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑				3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑					↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑					↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg			↑			
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg			↑			

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①イミフィンジ		500mg	3V	1500mg	1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
②イジュド		25mg	3V	75mg	75mg	生食 100mL	60 分/点滴
③ジェムザール		200mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
		1000mg					
④カルボプラチン		50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
⑤	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
⑥	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
⑦	生食	100mL	1V				15 分/点滴
⑧	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑨	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑩	生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔》(15 分)(60 分)(30 分)(60 分)(30 分)

投与順番》⑦→①→⑧→②→⑨→
(30 分)(30 分)(60 分)(5 分)
⑤→③→④→⑩→ 終了

《Day8》

投与間隔》15 分30 分5 分


投与順番》⑥→③→⑩→ 終了

【コメント】

- ・インラインフィルター付ルートを使用
- ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

◇レジメン No.01049 《非小細胞肺癌：イミフィンジ維持療法(1 コース、3 コース以降)》 呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	Day28	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	1500mg	↓	4 週間を 1 コース	↓



《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①イミフィンジ	500mg	3V	1500mg	1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
②生食	100ml	1V				15 分/点滴
③生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔》 (15 分) (60 分) (5 分)
投与順番》 ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

- ・インラインフィルター付ルートを使用

◇レジメン No.01050 《非小細胞肺癌：イミフィンジ+イジユド維持療法(2 コース目)》 呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	Day28
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	1500mg	↓	4 週間を 1 コース
イジユド 75mg/body	点滴	75mg	↓	

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①イミフィンジ	500mg	3V	1500mg	1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
②イジユド	25mg	3V	75mg	75mg	生食 100mL	60 分/点滴
③生食	100ml	1V				15 分/点滴
④生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑤生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔》 (15 分) (60 分) (30 分) (60 分) (5 分)

投与順番》 ③ → ① → ④ → ② → ⑤ → 終了

【コメント】

・インラインフィルター付ルートを使用

◇レジメン No.01051 《非小細胞肺癌：イミフィンジ+PEM 維持（1 コース、3 コース以降） 呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day28	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	mg	↓	4 週間を 1 コース	↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	4 週間を 1 コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①イミフィンジ		500mg			1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
②ペメトレキセド		100mg 500mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
③	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
④	生食	100mL	1V				15 分/点滴
⑤	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑥	生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》

投与間隔》 (15 分) (60 分) (30 分) (15 分) (10 分) (5 分)

投与順番》 ④ → ① → ⑤ → ③ → ② → ⑥ → 終了

【コメント】

- ・ インラインフィルター付ルートを使用
- ・ 投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバル 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、投与最終日から 22 日目まで継続する。

◇レジメン No.01052 《非小細胞肺癌：イミフィンジ+イジユド+PEM 維持（2 コース目） 呼吸器内科

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day28
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	mg	↓	4 週間を 1 コース
イジユド 75mg/body	点滴	mg	↓	
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	

(支持療法)


グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	4 週間を 1 コース
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①イミフィンジ		500mg			1500mg	生食 100mL	60 分/点滴
②イジユド		25mg			75mg	生食 100mL	60 分/点滴
③ペメトレキセド		100mg			mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg					
		150mg					
④	グラニセトン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
⑥	生食	100mL	1V				15 分/点滴
⑦	生食	100mL	1V				30 分/点滴
⑧	生食	50mL	1V				5 分/点滴

《Day1》



【コメント】

・インラインフィルター付ルートを使用

・投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバル 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、投与最終日から 22 日目まで継続する。

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day8 (/)		Day15 (/)	・ ・ Day21	Day1 (/)
テセントリク 1200mg/body	点滴	mg	↓					3 週 1 コース	↓
アブラキサン(nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		↓		↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6：Calvert 式)	点滴	mg	↓						↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑					3 週 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑						↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑						↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg			↑		↑		
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg			↑		↑		

↑ 患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名		規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①	テセントリク	1200mg			mg	生食 250mL	下記参照/点滴
②	アブラキサン	100mg			mg	生食 100mL	30 分/点滴
③	カルボプラチン	50mg			mg	ブドウ糖 5% 250mL	60 分/点滴
		150mg					
④	アロカリス	235mg	1V	235mg	235mg		30 分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg	9.9mg		
⑤	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	1mg		15 分/点滴
	デカドロン	6.6mg	1A	6.6mg	6.6mg		
⑥	生食	100mL					15 分/点滴
⑦	生食	50mL					5 分/点滴
⑧	生食	50mL					5 分/点滴
⑨	生食	50mL					5 分/点滴

(day1)

投与
間隔》 (15 分) (※ 1) (5 分) (30 分) (5 分) (30 分) (5 分) (60 分) (5 分)

投与
順番》 ⑥ → ① → ⑦ → ④ → ⑧ → ② → ⑧ → ③ → ⑨ → 終了

(day8、15)

投 与 間 隔 》 (15 分) (5 分) (30 分) (5 分)

投 与 順 番 》 ⑤ → ⑦ → ② → ⑧ → 終了


【コメント】

- ・※ 1 テセントリク 初回 60 分／2 回目以降 30 分
- ・調製：アブラキサン 1V あたり、生食 20ml で溶解したあと、生食のボトルを空にすること
(溶解し、採取したアブラキサンは生食で薄めないこと)
- ・テセントリクはインラインフィルター付ルートを使用
- ・アブラキサンはインラインフィルター付ルート使用不可
- ・アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・14	Day1 (/)
サイラムザ 10mg/kg	点滴	mg	↓	2 週 1 コース	↓

支持療法

ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑	2 週 1 コース	↑
----------------------	----	------	---	-----------	---



《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量 小計	投与量合計／日	希釈液/量	投与速度/方法
①サイラムザ	100mg			mg	生食 250mL	60 分/点滴
	500mg					
②ネオレスタール	10mg	1 V	10mg	10 mg	生食 100mL	15 分/点滴
③ 生食	100mL	1 V				30 分/点滴
④ 生食	50mL	1 V				5 分/点滴

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (60 分) (5 分)

投与順番≫ ② → ③ → ① → ④ → 終了

【コメント】

エルロチニブ：1 日 1 回 食間 150 mg/日 服用（休薬なし）

※ サイラムザ投与速度：初回 60 分、2 回目以降 30 分まで短縮可能