

◇レジメン No.10001 《悪性神経膠腫：アバスタチン+テモダール(内服)、ベバシズマブ BS+テモダール(内服)》 脳神経外科

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
アバスタチン or ベバシズマブ BS (Bevacizumab) 10mg/kg	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
① アバスタチン、ベバシズマブ BS	100mg			mg	生食 100mL	下記参照/点滴
	400mg					
② 生食	100ml					15分/点滴
③ 生食	50ml					5分/点滴

投与間隔》

(15分)

(下記参照)

(5分)

投与順番》

②

→

①

→

③

→

終了

【コメント】

①アバスタチン、ベバシズマブ BS 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分

初発：RT 併用することあり。(2Gy/day 週5日を6週間)

テモダール 75mg/m²/day 6週間内服後、4週間休薬。

その後、150mg/m²/day 5日間内服後、23日休薬 (28日1クール)

次のクールでは、200mg/m²/day へ増量可。

再発：150mg/m²/day 5日間内服後、23日休薬 (28日1クール)

次のクールでは、200mg/m²/day へ増量可。