

◇レジメン No.11002 《前立腺癌：カバジタキセル療法》 泌尿器科

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
ジェブタナ 20mg/m ²	点滴	mg	↓	3週1コース	↓
プレドニゾン 10mg/2×	経口	mg	連日服用		

支持療法

デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	3週1コース	↑
ガスター 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑

《薬剤調製》

患者投与量との一致を確認！

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェブタナ	60mg			mg	生食 250mL	60分/点滴
②	デカドロン	6.6mg	1V	6.6 mg	生食 100mL	15分/点滴
	ガスター	20mg	1A	20 mg		
	ネオレスタール	10mg	1A	10 mg		
③	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1A	1mg		30分/点滴
④	生食	50mL	1V			5分/点滴

投与間隔>> (15分) (30分) (60分) (5分)
 投与順番>> ② → ③ → ① → ④ → 終了

【コメント】

・ジェブタナはインラインフィルター付きルート使用

ジェブタナの溶解液

ジェブタナの投与量	溶解液
25mg/body 未満	生食 100ml
25mg～65mg/body	生食 250ml
65mg/body 以上	生食 500ml

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	...	Day8 (/)	...	Day15 (/)	...Day28	Day1 (/)
ジェムザール(GEM) 1,000mg/m ²	点滴	mg	↓			↓		↓	4週1コース	↓
シスプラチン (CDDP) 70mg/m ²	点滴	mg		↓						

(支持療法)

プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg		↑					4週1コース	
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg		↑						
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑			↑		↑		↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑		↑		↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg	 	 	mg	生食 100mL	30分/点滴
	1,000mg	 	 			
②シスプラチン	10mg	 	 	mg	生食 300mL	3時間/点滴
	25mg	 	 			
③	パロノセトロン点滴バッグ 0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg	 	15分/点滴
	デカドロン 6.6mg	1.5V	9.9mg	9.9mg		
④	グラニセトロン点滴バッグ 1mg	1V	1mg	1mg	 	15分/点滴
	デカドロン 6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
⑤	生食	50mL	1V	 	 	5分/点滴
⑥	生食	500mL	1V	 	 	4時間/点滴
⑦	生食	500mL	1V	 	 	4時間/点滴
⑧	生食	500mL	1V	 	 	4時間/点滴
⑨	生食	500mL	1V	 	 	4時間/点滴

(Day1,8,15)

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分)
 投与順番≫ ④ → ① → ⑤ → 終了

(Day2)

投与間隔≫ (4時間) (4時間) (15分) (3時間) (4時間) (4時間)
 投与順番≫ ⑥ → ⑦ → ③ → ② → ⑧ → ⑨ → 終了

【コメント】

.....

.....

.....

◇レジメン No.11006 《尿路上皮癌：CBDCA+GEM 療法》 泌尿器科

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ジェムザール 1000mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	3週を1コース	↓
カルボプラチン (AUC=4.5:Calvert式)	点滴	mg	↓			↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		3週を1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑			↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg		↑		
デカドロン 9.9mg/body	点滴	mg	↑			↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	mg		↑		

↑ 患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
① ジェムザール	200mg	 	 	mg	生食 100mL	30分/点滴
	1000mg	 	 			
② カルボプラチン	50mg	 	 	mg	ブドウ糖 5%250mL	60分/点滴
	150mg	 	 			
③	アロカリス	235mg	1V	235mg	 	30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg		
	デカドロン (Day1)	6.6mg	1.5V	9.9mg		
④	グラニセトロン点滴バッグ	1mg	1V	1mg	 	15分/点滴
	デカドロン (Day8)	6.6mg	1V	6.6mg		
⑤ 生食	50mL	 	 	 	生食 50mL	5分/点滴

(Day1)

投与間隔>> (30分) (30分) (60分) (5分)
 投与順番>> ③ → ① → ② → ⑤ → 終了

(Day8)

投与間隔>> (15分) (30分) (5分)
 投与順番>> ④ → ① → ⑤ → 終了

【コメント】

アロカリス投与時はプロイメンドまたは内服イメンドカプセルとの重複ないか確認

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)	4回繰り返す その後はオプジーボ単剤を 2週毎に投与
オプジーボ 240mg/body	点滴	240mg	↓	3週1コース	↓	
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓		↓	

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15分/点滴
②オプジーボ	240mg			240mg	生食 100mL	30分/点滴
③生食	100ml	1V				30分/点滴
④ヤーボイ	50mg			mg	生食 50mL	30分/点滴
⑤生食	50ml	1V				5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (30分) (30分) (5分)

投与順番≫ ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → 終了

【コメント】


インラインフィルター付ルートを使用

4回投与終了後はオプジーボ単独投与（2週毎）を継続

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…14	Day1 (/)
バベンチオ 10mg/kg	点滴	mg	↓	2週1コース	↓
インライタ 10mg/日	内服	mg	↓	↓	

支持療法

ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑	2週1コース	↑
アセリオ静注液 500mg/body	点滴	500mg	↑		↑



薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				30分/点滴
②バベンチオ	200mg			mg	生食 250mL	60分/点滴
③生食	50ml	1V				5分/点滴
④	ネオレスタール	10mg	1A	10mg		15分/点滴
	アセリオ静注液 ^{ハッグ}	1000mg	0.5V	500mg		

投与間隔≫

(15分)

(30分)

(60分)

(5分)

投与順番≫

④

→ ①

→ ②

→ ③

→ 終了

【コメント】 インラインフィルター付ルートを使用

・インライタ：1日2回食後 5mg/回 服用(休薬なし)

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3-5 (/)	...	Day9 (/)	...	Day16 (/)	...Day21	Day1 (/)
ブレオ(BLM) 30mg/body	点滴	30mg		↓			↓		↓	3週を1コース	
シスプラチン (CDDP) 20mg/m ²	点滴	mg	D1~5 連日投与								↓
エトポシド (VP-16) 100mg/m ²	点滴	mg	D1~5 連日投与								↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑							3週を1コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑						↑

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
① ブレオ	15mg	15mg	15mg	30mg	生食 50mL	5分/点滴
② シスプラチン	10mg	10mg	10mg	mg	生食 250mL	60分/点滴
	25mg	25mg	25mg			
③ エトポシド	100mg	100mg	100mg	mg	生食 500mL	2時間/点滴
④ パロノセトロン点滴バッグ デカドロン	0.75mg	1V	0.75mg	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg		
⑤ デカドロン	6.6mg	1V	6.6mg	6.6mg	生食 100mL	15分/点滴
⑥ 生食	100mL	100mL	100mL	100mL	生食 100mL	15分/点滴
⑦ 生食	50mL	50mL	50mL	50mL	生食 50mL	5分/点滴

(Day1)

投与間隔≫ (15分) (60分) (2時間) (5分)
 投与順番≫ ④ → ② → ③ → ⑦ → 終了

(Day2)

投与間隔≫ (15分) (5分) (60分) (2時間) (5分)
 投与順番≫ ⑤ → ① → ② → ③ → ⑦ → 終了

(Day3-5)

投与間隔≫ (15分) (60分) (2時間) (5分)
 投与順番≫ ⑤ → ② → ③ → ⑦ → 終了

(Day9,16)

投与間隔≫ (15分) (5分) (5分)
 投与順番≫ ⑥ → ① → ⑦ → 終了

【コメント】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day28	Day1 (/)
パドセブ 1.25mg/kg	点滴	mg	↓	↓	↓	4週1コース	↓

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15分/点滴
②パドセブ	30mg			mg	生食 100mL (1Vあたり 3.3mLの 注射用水で溶解)	30分/点滴
③生食	50ml	1V				5分/点滴

投与間隔≫

(15分)

(30分)

(5分)

投与順番≫

①

→

②

→

③

→

終了

【コメント】

最大投与量：125mg/回

◇レジメン No.11011 《膀胱癌：dd-MVAC》 泌尿器科

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	・・・Day14	Day1 (/)
メソトレキセート(MTX) 30mg/m ²	点滴	mg	↓		14日を1コース	↓
エクザール(VBL) 3mg/m ²	点滴	mg		↓		
ドキシソルビシン(DXR) 30mg/m ²	点滴	mg		↓		
シスプラチン(CDDP) 70mg/m ²	点滴	mg		↓		

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	235mg		↑	14日を1コース	
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg		↑		
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg		↑		
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A		↑		
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL		↑		

患者投与量との一致を確認！

《薬剤調製》

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①メソトレキセート	50mg			mg	生食 250mL	120分/点滴
②エクザール	10mg			mg	生食 100mL	15分/点滴
③ドキシソルビシン	10mg			mg	生食 100mL	15分/点滴
	50mg					
④シスプラチン	10mg			mg	生食 300mL	120分/点滴
	25mg					
⑤	アロカリス	235mg	1V	235mg	生食 500mL	30分/点滴
	パロノセトロン点滴バッグ	0.75mg	1V	0.75mg		
	デカドロン	6.6mg	1.5A	9.9mg		
⑥	硫酸マグネシウム	20mL	0.4A	0.4A		60分/点滴
⑦	マンニトール	300mL	0.67V	200mL		30分/点滴
⑧	生食	100mL		1V		15分/点滴
⑨	生食	50mL		1V		5分/点滴
⑩	生食	500mL		1V		60分/点滴

(Day1)

投与間隔≫ (15分) (120分) (5分)
 投与順番≫ ⑧ → ① → ⑨ → 終了

(Day2)

投与間隔≫ (30分) (15分) (15分) (60分) (30分) (120分) (60分)
 投与順番≫ ⑤ → ② → ③ → ⑥ → ⑦ → ④ → ⑩ → 終了

【コメント】

Day4 にジーラスタを投与

計6コース実施

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓	3週1コース	↓

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15分/点滴
②キイトルーダ	100mg			mg	生食 100mL	30分/点滴
③生食	50ml	1V				5分/点滴

投与間隔≫

(15分)

(30分)

(5分)

投与順番≫

①

→

②

→

③

→

終了

【コメント】

- ・レンバチニブ 20mg/日 連日服用を併用
- ・インラインフィルター付ルートを使用

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…42	Day1 (/)
キイトルーダ 400mg/body	点滴	mg	↓	6週1コース	↓

患者投与量との一致を確認

薬品名	規格	実際投与量	投与量小計	投与量合計/日	希釈液/量	投与速度/方法
①生食	100ml	1V				15分/点滴
②キイトルーダ	100mg			mg	生食 100mL	30分/点滴
③生食	50ml	1V				5分/点滴

投与間隔≫

(15分)

(30分)

(5分)

投与順番≫

①

→

②

→

③

→

終了

【コメント】

- ・レンバチニブ 20mg/日 連日服用を併用
- ・インラインフィルター付ルートを使用